GUIDE D'UTILISATION DES TUBES POUR ECHANTILLONS SANGUINS

PRE-MO-012
Version : 12

* **Les tubes de faibles volumes/sans gel** sont à utiliser uniquement pour les prélèvements difficiles et certaines analyses transmises

Tube héparine de Li

avec gel / sans gel*

Acide Urique
Albumine
ASAT / ALAT
Bicarbonates
Bilirubine
Calcium
Capacité de sat. de la transferrine
Cholestérol - Cholestérol HDL + LDL
CPK
Créatinine
Fer
Ferritine
Gamma GT
Haptoglobine
IgA / IgG / IgM
Ionogramme
LDH
Lipase
Magnésium
Osmolarité **(+ tube gris pour glucose)**
Phosphatase Alcaline
Phosphore
Protéine C réactive
Protéines
Transferrine
Triglycérides
Urée

Tube sec avec gel — **Tube sec** sans gel*

Benzodiazépines
Paracétamol

Tube sec avec gel — **Tube sec** sans gel*

Electrophorèse- Immunofixation
IgA / IgG / IgM

Tube sec avec gel — **Tube sec** sans gel*

ACE
AFP
ßHCG (Dosage)
CA 19-9
Folates sériques (vit B9)
PSA
T4L
TSH
Vitamine B12
Vitamine D

Tube sec avec gel — **Tube sec** sans gel*

Sérologie Hépatites B, C
Sérologie de la Toxoplasmose
Sérologie VIH

Tube héparine de Li

avec gel / sans gel*

1 tube	1 tube (Avertir le labo par téléphone envoi immédiat au labo)
Procalcitonine NT-pro BNP Troponine	Acide lactique Ca ionisé Carboxyhémoglobine Méthémoglobine

Seringue héparine de Li

(Avertir le laboratoire par téléphone, envoi immédiat au labo)

Acide lactique	Ca ionisé
Carboxyhémoglobine	Glucose
Ionogramme	Gaz du sang
Méthémoglobine	

Tube EDTA

NFS, Plaquettes
Réticulocytes
Recherche d'hématozoaires
Recherche d'Hématies fœtales
Recherche de schizocytes

Tube EDTA

Coombs direct
Groupe et Phénotype
RAI

Tube EDTA (1 tube par analyse)

Ammoniémie **TELEPHONER AU LABO AVANT PRELEVEMENT (transport immédiat au labo et sachet isotherme congelé ou réfrigéré pour les sites distants)**
HBA1c

Tube Citrate (2.7ml et 1.8 ml*) Remplissage impératif jusqu'au trait

TP
TCA
Fibrinogène
D-Dimères
Monomères de fibrine
Facteurs V
Héparine standard / HBPM
TCK
Plaquettes sur tube citrate (si agrégats sur EDTA)

Tube fluorure de Na (4ml et 2ml*)

Alcool
Glucose

Dépistage d'un diabète gestationnel

Pour tout autre examen non listé, se référer au manuel de prélèvement

Ordre de prélèvement :

« Biologistes, Je Recommande de Vérifier Vos Garrots »

CITRATE SEC HEPARINE EDTA
Microtubes pédiatriques

Homogénéiser immédiatement après le prélèvement par 8 retournements lents et successifs