

* Les tubes de faibles volumes/sans gel sont à utiliser uniquement pour les prélèvements difficiles et certaines analyses transmises

<p>Tube héparine de Li</p> <p>avec gel / sans gel*</p> <p>Acide Urique Albumine ASAT / ALAT Bicarbonates Bilirubine Calcium Capacité de sat. de la transferrine Cholestérol - Cholestérol HDL + LDL CPK Créatinine Fer Ferritine Gamma GT Haptoglobine IgA Ionogramme LDH Lipase Magnésium Osmolarité (+ tube gris pour glucose) Phosphatase Alcaline Phosphore Protéine C réactive Protéines Transferrine Triglycérides Urée</p>	<p>Tube sec avec gel Tube sec sans gel*</p> <p>ACE AFP CA 19-9 PSA Vitamine D</p> <p>Tube sec avec gel Tube sec sans gel*</p> <p>βHCG (Dosage) Folates Hépatites B, C T4L Toxoplasmose TSH VIH Vitamine B12</p>	<p>Tube EDTA</p> <p>NFS, Plaquettes Réticulocytes Recherche d'hématozoaires</p> <p>Tube EDTA</p> <p>Coombs direct Groupe et Phénotype RAI</p> <p>Tube EDTA (1 tube par analyse)</p> <p>Ammoniémie TELEPHONER AU LABO AVANT PRELEVEMENT (sachet isotherme réfrigéré, transport immédiat au labo) HBA1c Hématies fœtales</p>		
<p>Tube sec avec gel Tube sec sans gel*</p> <p>Barbituriques Benzodiazépines Paracétamol</p>	<p>Tube héparine de Li</p> <p>avec gel / sans gel*</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="542 1164 734 1523"> <p>1 tube</p> <p>Procalcitonine NT-pro BNP Troponine</p> </td> <td data-bbox="734 1164 1021 1523"> <p>1 tube</p> <p>(Avertir le labo par téléphone envoi immédiat au labo)</p> <p>Acide lactique Ca ionisé Carboxyhémoglobine Méthémoglobine</p> </td> </tr> </table>	<p>1 tube</p> <p>Procalcitonine NT-pro BNP Troponine</p>	<p>1 tube</p> <p>(Avertir le labo par téléphone envoi immédiat au labo)</p> <p>Acide lactique Ca ionisé Carboxyhémoglobine Méthémoglobine</p>	<p>Tube Citrate</p> <p>Remplissage impératif jusqu'au trait</p> <p>TP TCA Fibrinogène D-Dimères Facteurs V Héparine standard / HBPM TCK Plaquettes sur tube citrate (agrégats sur EDTA)</p>
<p>1 tube</p> <p>Procalcitonine NT-pro BNP Troponine</p>	<p>1 tube</p> <p>(Avertir le labo par téléphone envoi immédiat au labo)</p> <p>Acide lactique Ca ionisé Carboxyhémoglobine Méthémoglobine</p>			
<p>Tube sec avec gel Tube sec sans gel*</p> <p>Electrophorèse- Immunofixation IgA / IgG / IgM</p>	<p>Seringue héparine de Li</p> <p>(Avertir le laboratoire par téléphone, envoi immédiat au labo)</p> <p>Acide lactique Ca ionisé Carboxyhémoglobine Glucose Ionogramme Gaz du sang Méthémoglobine</p>	<p>Tube fluorure de Na (4ml et 2ml*)</p> <p>Alcool Glucose Epreuve simplifiée d'hyperglycémie Dépistage d'un diabète gestationnel</p>		

Pour tout autre examen non listé, se référer au manuel de prélèvement

Ordre de prélèvement

Homogénéiser immédiatement après le prélèvement par 8 retournements lents et successifs

