GUIDE D'UTILISATION DES TUBES POUR ECHANTILLONS SANGUINS

PRE-MO-012
Version : 11

* **Les tubes de faibles volumes/sans gel** sont à utiliser uniquement pour les prélèvements difficiles et certaines analyses transmises



Tube héparine de Li

avec gel / sans gel*

Acide Urique
Albumine
ASAT / ALAT
Bicarbonates
Bilirubine
Calcium
Capacité de sat. de la transferrine
Cholestérol - Cholestérol HDL + LDL
CPK
Créatinine
Fer
Ferritine
Gamma GT
Haptoglobine
IgA / IgG / IgM
Ionogramme
LDH
Lipase
Magnésium
Osmolarité **(+ tube gris pour glucose)**
Phosphatase Alcaline
Phosphore
Protéine C réactive
Protéines
Transferrine
Triglycérides
Urée

Tube sec avec gel / Tube sec sans gel*

Barbituriques
Benzodiazépines
Paracétamol

Tube sec avec gel / Tube sec sans gel*

Electrophorèse- Immunofixation
IgA / IgG / IgM

Tube sec avec gel / Tube sec sans gel*

ACE
AFP
CA 19-9
PSA
Vitamine D

Tube sec avec gel / Tube sec sans gel*

ßHCG (Dosage)
Folates
Hépatites B, C
T4L
Toxoplasmose
TSH
VIH
Vitamine B12

Tube héparine de Li

avec gel / sans gel*

1 tube	1 tube (Avertir le labo par téléphone envoi immédiat au labo)
Procalcitonine NT-pro BNP Troponine	Acide lactique Ca ionisé Carboxyhémoglobine Méthémoglobine

Seringue héparine de Li

(Avertir le laboratoire par téléphone, envoi immédiat au labo)

Acide lactique	Ca ionisé
Carboxyhémoglobine	Glucose
Ionogramme	Gaz du sang
Méthémoglobine	

Tube EDTA

NFS, Plaquettes
Réticulocytes
Recherche d'hématozoaires

Tube EDTA

Coombs direct
Groupe et Phénotype
RAI

Tube EDTA (1 tube par analyse)

Ammoniémie **TELEPHONER AU LABO AVANT PRELEVEMENT (sachet isotherme réfrigéré, transport immédiat au labo)**
HBA1c
Hématies fœtales

Tube Citrate

Remplissage impératif jusqu'au trait

TP
TCA
Fibrinogène
D-Dimères
Monomères de fibrine
Facteurs V
Héparine standard / HBPM
TCK
Plaquettes sur tube citrate (agrégats sur EDTA)

Tube fluorure de Na (4ml et 2ml*)

Alcool
Glucose
Epreuve simplifiée d'hyperglycémie
Dépistage d'un diabète gestationnel

Pour tout autre examen non listé, se référer au manuel de prélèvement

CITRATE SEC HEPARINE EDTA
Microtubes pédiatriques

Ordre de prélèvement

Homogénéiser immédiatement après le prélèvement par 8 retournements lents et successifs

(tube neutre = tube de purge) en 1er si système de prélèvement avec tubulure)