

## MATERIEL

- Flacon stérile à bouchon rouge
- Matériel pour gratter- Curette coupante.
- Surblouse imperméabilisée
- Gants de soins non stériles

## TECHNIQUE

- Vérifier l'identité du patient et la concordance avec la prescription médicale.
- Informer le patient de l'acte et le rassurer.
- Effectuer une friction hygiénique des mains (MO.HY.NDS.094).
- **Mettre des gants à usage unique et une surblouse à usage unique dans la chambre.**
  
- Effectuer un prélèvement cutané appuyé au niveau des sillons et éventuellement des vésicules perlées par grattage à la curette coupante.
  - o Il faut prélever des boutons/vésicules d'apparition récente qui n'ont pas encore été grattés par le patient.
  - o Il est inutile de prélever des lésions anciennes déjà grattées (croûtes).
  - o Ne pas hésiter à prélever plusieurs lésions pour optimiser les chances de mettre le parasite en évidence.
  - o Il est également possible en cas de lésions déjà grattées de prélever sous les ongles du patient à l'aide d'un bâtonnet type cure-dent ou autre (ongles avec lesquels le patient se gratte).
- Recueillir les squames dans un flacon stérile à bouchon rouge.
- Bien refermer le flacon
- Retirer la sur blouse et éliminer les gants.
- **Effectuer un lavage simple des mains (MO.HY.NDS.019)**
- Effectuer une friction hygiénique des mains.
- Identifier le flacon avec l'étiquette patient.
- Identifier et renseigner le bon de demande.
- Insérer le prélèvement dans le sachet de transport et le bon dans le compartiment extérieur du sachet.
- Transmettre immédiatement le prélèvement au laboratoire (PRE-PT-003) : [voir la fiche analyse correspondante à ce prélèvement dans le guide des analyses sur Intranet.](#)