

MATERIEL

- Ecouvillon stérile avec milieu de transport (bouchon rose)
- Gants de soins non stériles
- 1 spéculum stérile (facultatif sauf prélèvement d'endocol)
- Pour l'endocol :
 - pince
 - compresses stériles
 - solution antiseptique (bétadine dermique ou dakin) (PR.HY.NDS.017)
 - sérum physiologique

TECHNIQUE

- Vérifier l'identité de la patiente et la concordance avec la prescription médicale
- Informer la patiente de l'acte et la rassurer
- Effectuer une friction hygiénique des mains (MO.HY.NDS.094)
- Mettre les gants de soins

PRELEVEMENT VAGINAL

Les prélèvements sont à effectuer au niveau des lésions (s'il y en a) ou au niveau de leucorrhées anormales. En l'absence de lésion, recueillir les sécrétions en balayant l'ensemble de la cavité vaginale (exocol, culs de sac vaginaux, parois vaginales).

- Mettre en place le spéculum (si besoin).
- Effectuer le prélèvement
- Casser l'écouvillon dans le tube de milieu de transport (laisser l'écouvillon dans le tube) et bien refermer le tube.
- Retirer le spéculum.

PRELEVEMENT D'ENDOCOL

Les prélèvements sont à effectuer en insérant l'extrémité de l'écouvillon (environ 1 cm) dans l'endocol puis en le tournant à l'intérieur de l'endocol. **Il ne faut pas toucher les parois vaginales en insérant ou en retirant l'écouvillon.**

- Mettre en place le spéculum.
- Faire une antiseptie soigneuse de l'exocol à l'aide d'une pince et d'une compresse stérile imbibée d'un antiseptique (bétadine dermique ou dakin) : Laisser agir 1 min puis renouveler une fois l'antiseptie. Laisser encore agir 1 min. Rincer avec une compresse stérile imbibée de sérum physiologique. **Ceci évite la contamination du prélèvement par la flore vaginale.**
- Effectuer le prélèvement
- Casser l'écouvillon dans le tube de milieu de transport (laisser l'écouvillon dans le tube) et bien refermer le tube.
- Retirer le spéculum.



DANS LES 2 CAS :

- Identifier l'écouvillon avec les étiquettes patient **et préciser la localisation sur le tube en cas de prélèvements multiples (ex : vagin / endocol).**
- Mettre le tube dans le sachet de transport.
- Retirer et éliminer les gants selon le tri des déchets habituel (CAT-AA0290)
- Effectuer une friction hygiénique des mains.
- Identifier et renseigner le bon de demande d'examens
 - o **Renseignements cliniques indispensables :**
 - Grossesse → Ajout de la Recherche de Streptocoque du groupe B
 - Rupture prématurée des membranes ou Menace d'accouchement prématuré → Ajout de la Recherche de Bactérie à Haut risque infectieux pour la mère et le nouveau-né
 - Signes cliniques (Fièvre, leucorrhées, suspicion de vaginose ou de vaginite...)
 - Traitement antibiotique ou antifongique par voie locale ou générale

La recherche de *Trichomonas vaginalis* est à préciser sur le bon de demande.

- L'insérer dans le sachet de transport.
- Transmettre rapidement au laboratoire (CAT-AA59/PRE-PT-003): [voir la fiche analyse correspondant à ce prélèvement dans le guide des analyses sur Intranet.](#)

NB : Sur le bon il faut cocher :

- **SOIT** Recherche isolée de Streptocoque du groupe B

Recherche uniquement de Streptocoque du groupe B
Ensemencement 1 seule gélose spécifique
Pas d'examen direct
Réponse : Recherche positive ou négative

- **SOIT** Prélèvement vaginal

Ensemencement de plusieurs géloses
Examen direct effectué
Etude générale de la flore
Recherche de Strepto B incluse systématiquement chez toutes les femmes enceintes (quand la case « Grossesse » est cochée)



NE PAS COCHER LES 2 CASES