

MATERIEL

- 1 seringue (20cc) et une aiguille.
- Antiseptiques : **4 temps (PR.HY.NDS.017)**
- 1 pansement stérile.
- Champ stérile percé.
- Une protection
- Ampoule d'eau stérile
- 1 paire de gants stériles.
- Compresses stériles.
- 1 flacon stérile à bouchon rouge
- 1 tube vert hépariné

TECHNIQUE

- Vérifier l'identité du patient et la concordance avec la prescription médicale.
- Informer le patient de l'acte et le rassurer.
- Positionner le patient afin qu'il soit confortable et qu'il puisse maintenir la position sans difficultés.

INFIRMIER	MEDECIN
<ul style="list-style-type: none"> - Effectuer une friction hygiénique des mains (MO.HY.NDS.094) - Préparer le matériel nécessaire à l'acte et présentation au médecin à la demande - Faire une déterision (= 1^{er} temps) au niveau du point de ponction (ex : betadine scrub ou chlorexidine moussante) - Rincer (= 2^{ème} temps) - Sécher (= 3^{ème} temps) - Homogénéiser le tube par 4 ou 5 retournements lents et successifs. - Mettre le pansement stérile 	<ul style="list-style-type: none"> - Effectuer une friction hygiénique des mains - Mettre les gants de soins stériles et poser le champ - Antisepsie de la zone de ponction. (PR.HY.NDS.017) = 4^{ème} temps (ex : Bétadine alcoolique) - Introduction de l'aiguille jusqu'à la cavité articulaire - Raccorder la seringue à l'aiguille - Aspiration douce du liquide synovial - Retirer délicatement l'aiguille et la seringue Toujours commencer le recueil par le tube hépariné (bouchon vert) surtout s'il y'a peu de liquide en y introduisant directement le liquide contenu dans la seringue. Puis remplir le flacon stérile à bouchon rouge. Enlever l'aiguille. L'éliminer dans le collecteur à objets piquants/tranchants (MO.SI.NDS.037) - Comprimer ou faire compresser par le patient ou par IDE le site de ponction avec une compresse stérile

- Identifier les prélèvements avec les étiquettes patient.
- Déposer les prélèvements dans le sachet de transport.
- Retirer et éliminer les gants avec les déchets de soins.
- Effectuer une friction hygiénique des mains.

- Identifier et renseigner le bon de demande

○ **Renseignements cliniques indispensables :**

- Articulation ponctionnée
- Signes cliniques, diagnostic suspecté
- Traitement antibiotique

- L'insérer dans le sachet de transport.
- Transmettre le prélèvement **le plus rapidement possible** au laboratoire (PRE-PT-003) : [voir la fiche analyse correspondant à ce prélèvement dans le guide des analyses sur Intranet.](#)